



新興毒品認識與防毒技巧



謝文智


藥頭沒有告訴你的事

- K他命不會上癮，偶爾拉K不會有事
- 拉K不會傷身體，有解K丸(液)
- 玩K不會被抓(未滿18歲不會被判刑)
- 你拉的K純嗎?
- 大哥不會出賣我




毒販吸引吸毒者過程

- 吸毒指導者(tour guide)
- 誘餌(come-ons)
- 上鈎毒品(gateway)
- 免費過癮(free fixes)
- 染上毒癮(use the needle)
- 上了鈎(hooked)
- 賒購毒品(front)
- 永久用戶(users)




警罵毒蟲「販毒不應該 還賣假毒品」



酒、毒品、搖頭趴、暴斃、猝死



學生吸毒人數 10年來20倍速成長
新莊摩鐵傳男女疑吸食笑氣暴斃
學長餵搖頭丸 女大生摩鐵嗑藥亡
水萍塢公園驚見男屍 疑吸毒致死
癌男旅館開毒趴 疑吸毒過量暴斃
3男吸K開毒趴 休克送醫1死1昏迷



高雄一名不肖孫前晚吸食毒品「毒咖啡」後，
先持菜刀砍死奶奶，再殺害行動不便的爺爺焚屍







吸毒者的人生

警車



靈車






解K水、丸

- 牛奶(45.1%)
- 水(35.3%)
- 綠茶(21.6%)
- 諾得膠囊
- 雞湯+靈芝
- 維他命B群
- 解毒針



大學生吸毒氾濫 調查顯示：5%嗑過藥


- 最常接觸違禁藥品的場所是PUB，佔47.6%，其次是KTV，佔27.2%
- 藥品種類以搖頭丸為最多有65.3%，其次是大麻，有44.2%，號稱「約會強暴藥」的FM2，也有27.2%。
- 面對違禁藥品誘惑，有近6成學生堅持不吃，但亦有16.1%的大學生認為試試無妨，假如有人提供不用錢的違禁品，有近1成的大學生願意吸食；使用違禁藥品的主要原因大多是因場合氣氛配合而使用，有32.4%的比例。





青少年藥物濫用問題嚴重嗎？

- 全國大專校院學生藥物使用盛行率與其相關心理社會因素之追蹤研究（柯慧貞教授，2004年）
- **大學生：2.1%**（每50個大學生有一個吸毒）
- 男生、零用錢超過一萬元、成績較差、在外租屋、打工學生
- 用最多的是搖頭丸與大麻
- **吸毒交際**




- 
- 有抽菸、喝酒、吃檳榔習慣，個性比較憂鬱、衝動、欠缺思考與計畫的學生是使用毒品高危險群
 - 92%的人第一次吸毒時不是一個人，且是被邀請
 - 70%至80%的人第一次嘗試毒品的主要原因是好奇，其次是「與朋友起鬨」。
 - 初次使用後，2—15天內會嘗試第二次，並在兩個月左右成為「癮君子」



@檳榔西施白天賣K毒，晚上夜校也賣K毒
@酒促美眉拉K半年，膀胱變彈珠小頻尿
@K他命毒害年輕人 大腦、膀胱都萎縮
@賣毒被抓不後悔 科大生打工走偏
@大學生製毒打工 月薪1萬換5年牢
@離譜！大學生下課號召吸毒
@汽車旅館內慶生 大學生吸毒助興
@拉K雙腿萎縮 走路像螃蟹




@26歲男拉K拉到包尿布 斷掌自
殺大喊：我不想活了
@拉K包尿布被女友拋棄 壯男上
吊：我讓愛我的人失望了





新興藥物濫用特性

- 跳脫傳統樣式，辨識度低
- 從單一藥物濫用到多重藥物濫用
- 藥物成分複雜，品質不精純
- 藥品混搭毒性高，傷害性大
- 無法控制劑量，致死率高
- 合成大麻素（23%）、苯乙胺（23%）和合成卡西酮（18%）



新興毒品高達八成混摻 單一毒品曾驗出14種以上有毒物質


- 「喵喵」
- 「浴鹽」MDRV
- 「一粒眠」BZO
- 「K他命」
- 「搖頭丸」--神經毒
- 「非那西汀」--致癌物
- 「XLR-11」(咧哞)類大麻物質



吸收國高中生當下線 青少 年販K集團被破 2010/09/22



〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣警局會同刑事警察局昨天在新竹縣偵破一個K他命販毒集團，4名青少年嫌犯短短1年間吸收了40多名客戶，其中包括在學的國、高中生，部分青少年因此被毒品控制，甚至被黑幫吸收成了小弟。



校園掃毒 小藥頭僅15歲

2010/09/22



嘉義一名年僅15歲的黃姓國三生涉嫌賣K他命給11名同學吸食，賺取每包200元的差額。黃姓少年說，都在學校附近紅茶店的巷子及學校後門交貨；一名吸毒的少年甚至說，他們將K他命摻入香菸內，偷偷在校園內的舊校長宿舍吸食。


K毒安毒海洛因 查獲3合1 毒奶茶包



- 基隆警方在一家KTV起出26包印有「經典台灣味」、「香約奶茶」字樣的奶茶包，打開一看，裡面竟是摻雜K他命、海洛因及安非他命的三合一複合毒品



新興毒品 【浴鹽】 台灣現蹤



- MDPV這種合成興奮物質並非是真的製造來做為沐浴清潔用品，只是因為它的結晶顆粒長得像浴鹽，俗名就被叫作浴鹽，成分比搖頭丸更要命，民眾要小心，千萬不要掉入毒品陷阱



幫派入校園 教唆學生賣毒品

2011/01/19



竹聯幫豹堂特攻隊涉嫌在校園吸收幫眾，教唆販售K他命，並糾眾霸凌學生，幫派裡還有嚴格內規和行動制服，警方監控半年，18日13名幫眾傳喚到案，其中有9個都是未成年。

兄弟校園討毒債 血染釘棒



警方指出，該集團梁姓主嫌（十九歲，毒品前科）去年自后綜中學高中部畢業，在校期間即涉嫌吸收同學和學弟為其販毒，包括其同學魏光輝（二十歲）及現仍就讀該校國中部的胞弟（十五歲），主要販賣K他命，一小包五百元或一千元。



毒癮暗潮 全台洶湧 - 新鴉片戰爭



- 監獄裡有**四成五**的人口是因**毒品**而判刑。
- 監獄裡**七成以上**的人口是因**吸毒和販毒**，衍生殺、搶、偷等社會案件而入獄。
- 他們的**回監率**高達**九成**。

天下雜誌405期



防制學生藥物濫用 警語



只要健康不要「毒」

www.wretch.cc/blog/tina700707

STOP 



- 台灣一年花費**51億**在吸毒者的戒治上(包含勒戒所、戒治所及監獄)占法務部年度預算的**五分之一**(不包括調查局緝毒的預算，還有治安危害的社會成本，及衍生疾病的醫療成本)
- 毒癮再犯率高達**75.6%**

一日吸毒 終身戒毒




拉K無罪，吞E萬歲？

• 毒品危害防制條例（98年11月20日施行）

第11條

持有第三級毒品純質淨重二十公克以上者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金。

持有第四級毒品純質淨重二十公克以上者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以下罰金。



毒品危害防制條例

第 11-1 條

無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並應限期令其接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習。

少年施用第三級或第四級毒品者，應依少年事件處理法處理

少年事件處理法

第 42 條

少年染有煙毒或吸用麻醉、迷幻物品成癮，或有酗酒習慣者，令入相當處所實施禁戒。

警訊：毒品向下延伸



國內常見毒品之分級

第一級毒品：

海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼。

第二級毒品：



安非他命、甲基安非他命、**MDMA (搖頭丸)**、液態快樂丸 (GHB)、大麻、**LSD (搖腳丸、一粒沙)**、速賜康、白板、天使塵。

第三級毒品：

FM2、小白板、**Ketamine (K他命)**、**Nimetazepam (一粒眠)**、紅中。

第四級毒品：

蝴蝶片 (Alprazolam)、Diazepam (安定、煩寧)、Lorazepam。



常見藥物濫用一覽

藥物名稱	分級	常見吸食方式	價格 (公克or粒)	功用	戒斷困難度	備考
安非他命	第二級	水車法 追龍	3600~4000	興奮 (中HIGH)	80%	
搖頭丸	第二級	直接吞食 (可配可樂)	350~500	自信心與 活力大增	50%	PUB或舞廳 常用
K他命	第三級	拉K或K煙	400~800	興奮 (次HIGH)	30%	目前最受年 輕人歡迎
FM2	第三級	服用錠劑	350~550	嗜睡及 短暫失憶	30%	歹徒常用犯 罪工具
一粒眠	第三級	服用錠劑	20~50	興奮感	30%	



含眠、吞E、拉K



鴉片

鴉片（阿片）

英文名：Opium

俗名：芙蓉膏、福壽膏

分級：第一級第8項

醫療用途：鎮痛、止瀉


濫用方式：經口煙吸




嗎啡



海洛因



海洛因
英文名：Heroin, Diacetylmorphine
俗名：白粉、四號、細仔
分級：第一級第6項
醫療用途：無
濫用方式：注射、吸食



古柯鹼



正

點到四點改為「排」

1克1萬 藝人吸「古柯鹼」超「高檔」

11:59 公路、南橫公路、竹東到尖石的縣道122

嘉表12-28 台股 7626.29 +1.67 美元 32.67 32.68

安非他命

安非他命



英文名：**Amphetamine**

俗名：冰塊、安公子、
冰糖、安仔、

分級：第二級第12項

醫療用途：無

濫用方式：注射、煙吸



藥用K他命



on.cc

索K常見徵狀

徵狀	人數(百分比)	徵狀	人數(百分比)
神志不清	106 (45%)	心跳過快	91 (39%)
腹痛	49 (21%)	血壓高	93 (40%)
下尿道徵狀 (小便困難、 尿急及尿頻等)	28 (12%)	鼻孔有白色粉末	40 (17%)
暈眩	28 (12%)	腎積水	4 (1.7%)
		膽管脹大	2 (0.8%)

註：研究總人數233人

資料來源：中毒諮詢中心

MDMA—搖頭丸



亞甲基雙氧甲基安
非他命（搖頭丸）

英文名：**MDMA**

俗名：搖頭丸、快
樂丸、衣服、E

醫療用途：無

濫用方式：口服



MDMA—搖頭丸




PMMA (副甲氧基甲基安非他命)

幻想、幻聽、興奮、冒汗



FM2—強姦藥丸



氟硝西洋 (FM2)

英文名：
Flunitrazepam,(FM2)

俗名：十字架、強姦藥丸、FM2

分級：第二級

醫療用途：鎮靜、安眠

濫用方式：口服、注射



速眠安(藍精靈)



一粒眠

硝甲西洋 (硝甲氮平)


英文名：Nimetazepam
(Erimin)

俗名：一粒眠

分級：第四級第44項

醫療用途：催眠、鎮靜

濫用方式：口服



5-Meo-DIPT(PEACE)

迷幻藥(歐妹兒一代，二代)

英文名：5-Meo-DIPT

俗名：火狐狸，媚藥

分級：

醫療用途：無

濫用方式：口服



使用後有強烈幻覺，空間和時間感變遲緩，導致幻聽、視力喪失、行動遲緩，嚴重甚至死亡

新興毒品


cfy (crazy fiying) 號稱是目前國內有史以來最強力的迷幻藥，吸食之後會產生如春藥般的興奮作用，讓吸食者在無法控制下，短暫失去記憶，瘋狂性交，到了第2天而不自覺，渾然不知發生前晚發生何事。

火狐狸 (foxy)、黑貓 (black-cat) 等，則是國內藥頭最新研發出的「台灣製」搖頭丸，混雜包括安非他命、腦新及多種不明成份的藥物，藥效號稱比傳統搖頭丸高6倍，可以持續12個小時。

5-meo及meo-peace (歐妹兒1代及2代) 則是同志轟趴時所使用的興奮劑，可以供口交或是肛交時使用。

「**飄飄丸**」，搖頭丸磨粉加上安非他命的混合品，但服用後藥效加強，可以讓人「飄飄欲仙」，近來再搖頭店及舞廳受到高度歡迎，因此才取名「飄飄丸」。


花塔餅




on.cc
東方互動



大麻



K2-JWH-018



火之吻





神仙水



含笑半步癲

海鹽



近年六種主要新興毒品

毒品名稱	簡介	對人體的損害
K2 (合成大麻)	把草本物質製成捲煙，再噴上大麻的化學物質，毒性比大麻強	產生幻覺，增加精神病或情緒病風險。
「咖啡奶茶」	由K仔和冰毒合成的催情毒品，可溶於咖啡或奶茶，甚至被偽裝為即溶咖啡	多被人用作令人性興奮的迷姦藥，劑量過多會令人暴斃。
喵喵	由麻黃素等化學物質合成的興奮劑	發熱、休克、產生強烈幻覺，有人曾把自己的睾丸扯斷也不感痛楚，甚至暴斃。
「浴鹽」	由喵喵等其他毒品合成的毒品，毒性比可卡因強十倍	產生帶有攻擊性的強烈幻覺，甚至血壓急升致暴斃。
Happy水	由K仔和搖頭丸合成的催情毒品，可溶於飲品	多被人用作令人性興奮的迷姦藥，劑量過多會令人暴斃。
花塔餅	本為杜蟲藥，但服用十倍以上分量變相成興奮劑	服用過量會有致敏反應，甚至暴斃。

各類毒品的禍害

毒品名稱	影響
大麻 (草)	舉止失常、判斷力失準、支氣管炎、結膜炎、內分泌紊亂
麻古冰毒	失眠、抑鬱、中毒性精神病、食欲不振、心臟和腎臟衰竭
可卡因 (可樂、霹靂可樂)	激動不安、精神錯亂、被迫害感覺、影響記憶力、性無能、死亡
搖頭丸	脫水、筋疲力盡、肌肉衰弱、身體過熱、抽搐、崩潰
氯胺酮 (K仔)	說話含糊、長期記憶力衰退、膀胱容量減少、失禁
合成大麻素 (K2)	出現幻覺、情緒波動、血壓上升及心跳加速、痙攣
卡西酮的衍生物 (喵喵)	影響知覺、損害記憶、表現行為怪異、出現妄想及幻覺
開心水或Happy水	毒品較新，未有一致評估，或合成冰毒、搖頭丸和K仔三種毒品的影響
咖啡粉	毒品較新，未有一致評估，估計與搖頭丸毒性相近



毒潮引爆愛滋危機

*男性1萬6千474人，女性1492人(2009)


*海洛因靜脈注射成為台灣愛滋
病毒大流行的途徑。

* 33%是因為注射藥癮

*七成是吸毒者交互感染。



吸食方式



常見施用毒品方法

一、煙吸



二、鼻吸

三、注射

四、口服



煙吸



鼻吸




注射




毒品濫用者之外形症狀特徵

器官部位	症狀特徵
眼部	瞳孔擴大(安非他命、迷幻劑)、眼眶泛黑(安非他命、K他命)、眼睛出血(安非他命)
鼻部	鼻孔發紅、破皮(安非他命)、流鼻水(K他命)
口部	持續性口乾舌燥(安非他命)、說話含糊不清、散慢(安非他命、FM2、K他命或其他鎮靜安眠劑)
手部	手部顫抖(安非他命)
皮膚	潮濕出汗、長痘子(安非他命)
器官	主動脈弓發炎致大血管夾層性出血(安非他命)
體重	喪失食慾，體重急速減輕(安非他命、MDMA)
其他	失眠、作息改變、緊張(安非他命、MDMA)、大量出汗、體臭、汗液有藥味(安非他命)、想睡、搖晃(FM2、K他命或其他鎮靜安眠劑)、有強烈塑膠臭味(安非他命、K他命)、臉色慘白





毒品濫用者之行為表徵

- 情緒方面
多話、躁動不安、沮喪、好辯
- 身體方面
嗜睡、食慾不振、目光呆滯
結膜紅腫、步履不穩、靜脈炎
- 感官表達方面
視幻、聽幻、無方向感
- 社會適應方面
多疑、誇大、好鬥、無理性行為、缺乏動機




帥哥變成糟老頭兼短命 美女變成老巫婆又早死

- 持續吸毒者壽命難逾四十
- 吸毒者的平均壽命較一般人群短10~15年。
- 25%吸毒成癮者會在開始吸毒後10~20年後死亡。
- 也就是說約1/4的吸毒者會在30~40歲死於與吸毒相關問題。
- 因為大部分吸毒者是在20歲前後開始吸毒的。



- K他命可產生幻覺及誘發精神分裂症病狀，會造成發育中腦部細胞之細胞凋亡性神經退化，這段的意思是說你有可能會變精神分裂或者是笨蛋。
- 吸食K他命以後會造成膀胱壁的刺激性的，使膀胱黏膜表層產生發炎潰瘍，而產生嚴重頻尿、血尿、下腹痛甚至尿不出來，長期下來會導致膀胱壁嚴重的纖維化，使病人的膀胱容量極小，甚至不到50cc，最後有可能需膀胱全切除，終其一生用人造膀胱或背尿袋，最新的報告發現有一部份病人會引起腎水腫甚至腎衰竭須終身接受洗腎。




一名吸食K他命患者的膀胱容量明顯縮小，僅剩正常膀胱的四分之一。
(圖：書田診所泌尿科主任林儒廷提供)

頻尿...



say no



say know

拒絕毒品
一次都不要



感謝聆聽
敬請指教

